

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COMISSÃO PERMANENTE DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA

Cloridrato de clomipramina é um antidepressivo da classe dos tricíclicos. Tem seu uso mais embasado no transtorno obsessivo compulsivo (TOC)^{1,2,3,4,5}. Embora seja usada em estudos experimentais⁵ para depressão⁶, pânico⁷, ou dor crônica neuropática.^{8,9}, tais indicações ainda não possuem dados suficientes para comprovar sua eficácia clínica. É considerado fármaco de segunda linha no manejo do TOC em pacientes refratários ao uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) e à psicoterapia, devido principalmente ao seu pronunciado perfil de efeitos adversos anticolinérgicos e sedação^{1,4}. Não há dados epidemiológicos no município de Florianópolis para quantificar o número de pacientes com TOC que não respondem ao tratamento de primeira linha. Na Remume (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) de Florianópolis atualmente há dois ISRS disponíveis para tratamento do TOC, o cloridrato de fluoxetina e o cloridrato de sertralina, sendo estes considerados primeira linha de tratamento.

Recomendação: não inclusão de cloridrato de clomipramina na Remume 2011.

Referências

1. CHOI, Y. J. Efficacy of treatments for patients with obsessive-compulsive disorder: a systematic review. *Journal of the American Academy of Nurse Practitioners*. v. 21, n. 4, p. 207-213, 2009.
2. SIMPSON, H. B. *et al.* Response versus remission in obsessive-compulsive disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*. v. 67, n. 2, p. 269-276, 2006.
3. SOOMRO M. G. Obsessive compulsive disorder. In: *Clinical Evidence*. London: BMJ Publishing Group, sep. 2009. Disponível em: <<http://clinicalevidence.bmj.com>>. Acesso em: 5 maio 2010.
4. HEYMAN, I.; MATAIX-COLS, D.; FINEBERG, N. A. Obsessive-compulsive disorder. *British Medical Journal*, v. 333, n. 7565, p.424-429, aug. 2006.
5. CLOMIPRAMINE: drug information. *Up to Date Online*. Disponível em: <<http://www.uptodate.com>>. Acesso em: 5 maio 2010.
6. STAGE, K. B. Orthostatic side effects of clomipramine and moclobemide during treatment for depression. *Nordic Journal of Psychiatry*, v. 59, n. 4, p. 298-301, 2005.
7. DUSSELDORP, E. *et al.* Which panic disorder patients benefit from which treatment: cognitive therapy or antidepressants? *Psychotherapy and Psychosomatics*, v. 76 n. 3, p. 154-161, 2007.
8. DUEHMKE, R. M.; HOLLINGSHEAD, J.; COMBLATH, D. R. Tramadol for neuropathic pain (Cochrane Database of Systematic Reviews). *The Cochrane Library*, jul. 2006, CD003726. Disponível em: <<http://cochrane.bvsalud.org>>. Acesso em: 5 maio 2010.
9. YANG, M. *et al.* Non-antiepileptic drugs for trigeminal neuralgia (Cochrane Database of Systematic Reviews). *The Cochrane Library*, jan. 2011, CD004029. Disponível em: <<http://cochrane.bvsalud.org>>. Acesso em: 11 janeiro 2011